

New 晩生 ネオウまかろーる(ニューダン)



ヘイスーダン ネオウまかろーる うまかろーる



播種量: 8kg/10a
(ロールベール用)
3kg/10a(青刈用)
播種期: 5月上旬～8月中旬

Point!

- うまかろーるよりも……
- ① 稈径が細くて乾きやすい
 - ② 耐倒伏性に優れる
 - ③ 刈り遅れの心配が少ない

利用目的で選べるスーダングラス

極早生

ロールスイートBMR

✓ 消化し難いリグニンの含量が低く、消化性に優れる BMR 品種。
✓ 細茎で乾き易く、ロールベール利用に適する。
✓ 紫斑点病などの葉病害耐性に優れる。

播種量: 8 kg/10a(ロールベール用)
播種期: 5月上旬～8月中旬
収穫期: 出穂前の草丈 1.5m 以上～出穂始め
(5月播きで55～60日程度)

極早生

ヘイスーダン

初期生育、再生力旺盛!
細茎で乾きやすい!

播種期: 5月上旬～8月中旬
播種量: 6～8kg/10a(ロールベール用)

早生

リッチスーダン

(スプラント)

消化性に優れ、よく食べる!
葉病害抵抗性に優れる!

播種期: 5月上旬～8月中旬
播種量: 6～8kg/10a(ロールベール用)

消化性

葉病対策

再生力

短尺ソルゴー

紫斑点病に強く、1.5m～2.0m程度の草丈で小型の子実型ソルガム

播種時期: 5月上旬～8月中旬
播種量: 3～4kg/10a(散播)

ビッグシュガーソルゴー
(シュークソルゴー405)
草丈高く、収量性が優れる!

シュガーグレイズ

高糖分タイプのソルガム
「高糖分ソルゴー-DH」の代替品種

播種時期: 5月上旬～8月中旬
播種量: 3～4kg/10a(散播)

ハイグレンソルゴー
トウモロコシとの混播に適する!

雪印ハイブリッドソルゴー
(FS1261)
多用途に使えるソルゴー型品種

ヒエ

青葉ミレット

耐湿性に優れる大型の飼料用栽培ヒエ!

播種時期: 5月中旬～8月上旬
播種量: 3～4kg/10a

アワ

ジャーマンストレインR

(旧商品名 イタリヤミレットR)
乾草調整しやすく生育が早い品種

播種時期: 5月中旬～7月下旬
播種量: 3～4kg/10a

アワ

なつ乾草

生育が早く、乾きやすい品種

播種時期: 5月中旬～8月下旬
播種量: 3～4kg/10a

ローズグラス

カタンボラ (コート種子)

茎が細く直立型なので収穫作業がしやすい

播種時期: 5月上旬～8月中旬
播種量: コート種子/5～6kg/10a

ギニアグラス

ソイルクリーン

生育旺盛な多収品種

播種量: 1～1.5kg/10a

夏草に+αで!!

テフグラス ST-1

(SAブラウン) コート種子

播種量: 1～2kg/10a
播種時期: 3月下旬～9月上旬

細茎でやわらかく、嗜好性に優れる。
40日前後で収穫可能
耐湿性に優れる。

とにかく良く食べる夏草

混播利用が可能

ST-1 : 1kg/10a + **青葉ミレット : 3.0kg/10a** …… 水田転換畑でより多収を狙う

ST-1と青葉ミレットは生育時に冠水するような圃場でも、比較的湿害を受けにくく生育します。

ST-1 : 1kg/10a + **なつ乾草 : 3.0kg/10a** …………… 畑地で乾草多収を狙う

ST-1 : 1kg/10a + **ローズグラス(コート) : 4.0～5.0kg/10a** … ST-1が初期生育時の雑草を抑制し、ローズグラスの再生草も狙う

雪印種苗のサイレージ用乳酸菌

サイマスタ-3

イタリアンライグラスの予乾牧草サイレージの二次発酵対策にも効果的

サイマスタ-SP

トウモロコシ、ソルガムのサイレージにおけるカビ・酵母の増殖を抑え、二次発酵防止が期待できます。

サイマスタ-LP

牧草・飼料作物サイレージの乳酸発酵促進に、サイレージ用乳酸菌の定着。中水分の牧草やトウモロコシなどの飼料作物に。*乳酸菌のみ

サイマスタ-AC

牧草・飼料作物サイレージの乳酸発酵促進に、サイレージ用乳酸菌の定着。低糖高水分の牧草や食品副産物に。*乳酸菌+アクレキ酵素